

Funkce více proměnných

Vázané extrémy

Nalezněte extrémy dané funkce vzhledem k vazbě

1. xy ; $x + y = 1$
2. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b}$; $x^2 + y^2 = 1$
3. $x^2 + y^2$; $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
4. $x^m y^n z^p$; $x + y + z = a$, $m, n, p, a > 0$
5. $\sin x \sin y \sin z$; $x + y + z = \frac{\pi}{2}$, $x, y, z > 0$
6. $\sum_{i=1}^n x_i^p$; $\sum_{i=1}^n x_i = a$, $p > 1, a \geq 0$.

Nalezněte největší a nejmenší hodnotu funkce na uvedené množině

7. $x - 2y - 3$; $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1$
8. $x^2 - xy + y^2$; $|x| + |y| \leq 1$
9. $x^2 + y^2 - 12x + 16y$; $x^2 + y^2 \leq 25$
10. $x + y + z$; $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$.
11. Při jakých rozměrech má kvádr daného objemu nejmenší povrch?
12. Do daného kužele vepište hranol o n -úhelníkové podstavě, který má maximální objem.
13. Najděte vzdálenost bodu (p, q, r) od roviny $ax + by + cz + d = 0$.
14. Najděte vzdálenost d dvou mimoběžek

$$\begin{array}{ll} x = X_1 + at & x = X_2 + pt \\ y = Y_1 + bt & y = Y_2 + qt \\ z = Z_1 + ct & z = Z_2 + rt. \end{array}$$

15. Pomocí hledání vázaných extrémů dokažte
- AG nerovnost $\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n}$, $a_i \geq 0$
 - Hölderovu nerovnost $\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq (\sum_{i=1}^n x_i^p)^{\frac{1}{p}} (\sum_{i=1}^n y_i^q)^{\frac{1}{q}}$, $x_i, y_i \geq 0$, $p > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
16. V počátku kartézských souřadnic je umístěn bodový náboj Q .
- Jaké bodové náboje Q_A , Q_B , Q_C musíme umístit do bodů $A = (3, 0, 0)$, $B = (0, 3, 0)$, $C = (0, 0, 4)$, aby náboj q v bodě $(1, 1, 1)$ byl v rovnováze.
 - Bude tato rovnováha stabilní?

Věta o regulárním zobrazení

17. Vyřešte rovnici $(z_y)^2 z_{xx} - 2z_x z_y z_{xy} + (z_x)^2 z_{yy} = 0$ tím, že položíte $x = u$, $y = v$, $z = w$ a přepíšete ji na rovnici pro funkci u proměnných v a w .
18. Vyjádřete první složku f_x vektoru $\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$ ve sférických souřadnicích $x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = r \cos \theta$.

Přepište do nových proměnných

19. $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$, $u = x$, $v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$, $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$
20. $z_{xx} + z_{yy} = 0$, $u = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $v = -\frac{y}{x^2 + y^2}$
21. $x^2 z_{xx} - (x^2 + y^2) z_{xy} + y^2 z_{yy} = 0$, $u = x + y$, $v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

VÁZANÉ EXTREMY

Hledáme extrémy funkce $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ za podmínky, že platí $g(x) = 0$, kde $g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$.

Metoda Lagrangeových multiplikátorů: Body podezřelí z extrémů jsou: $a \in \mathbb{R}^N$ t.č. $\nabla g(a) = 0$

a pokud $\nabla g(a) \neq 0$, pak takové body, které splňují $g(a) = 0$ a $\nabla(f - \lambda g)(a) = 0$ pro nějaké $\lambda \in \mathbb{R}$.

[pro více vazeb analogicky s $f - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i$], podmínka $\nabla g(a) \neq 0$ je nahrazena maximální hodnotou matice $\begin{pmatrix} \nabla g_1 \\ \vdots \\ \nabla g_m \end{pmatrix}(a)$

1) $f(x,y) = xy$ $g(x,y) = x+y-1$

Máme $\nabla g = (1,1) \neq 0$ všude

Označme $L(x,y) = f(x,y) - \lambda g(x,y) = xy - \lambda(x+y-1)$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = y - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = x - \lambda = 0 \\ g(x,y) = x+y-1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \lambda \\ x = \lambda \\ \lambda + \lambda - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \Rightarrow a = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \text{ je podezřelý bod.}$$

$f(a) = \frac{1}{4}$, $f(0,1) = f(1,0) = 0 \Rightarrow$ v bodě a je lokální maximum

2) $f(x,y) = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}$ $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ Očividně $a, b \neq 0$.

Máme $\nabla g = (2x, 2y)$, $\nabla g = 0$ jen pro $x=y=0$, to však nespĺňuje podmínku $g(x,y) = 0$.

$L(x,y) = \frac{x}{a} + \frac{y}{b} - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = \frac{1}{a} - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{1}{b} - 2\lambda y = 0 \\ g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2a\lambda} \\ y = \frac{1}{2b\lambda} \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{4a^2\lambda^2} + \frac{1}{4b^2\lambda^2} - 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} \right) \Rightarrow \lambda = \pm \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2|a| \cdot |b|}$$

Máme dva body: $A = \left(\frac{|a||b|}{a\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{|a||b|}{b\sqrt{a^2+b^2}} \right)$ a $B = \left(-\frac{|a||b|}{a\sqrt{a^2+b^2}}, -\frac{|a||b|}{b\sqrt{a^2+b^2}} \right)$

$f(A) = \frac{|a||b|}{\sqrt{a^2+b^2}} \cdot \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) > 0$ a $f(B) = -\frac{|a||b|}{\sqrt{a^2+b^2}} \cdot \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) < 0$. Očividně A je lok. maximum a B je lok. minimum

3) $f(x,y) = x^2 + y^2$ $g(x,y) = \frac{x}{a} + \frac{y}{b} - 1$ Očividně $a, b \neq 0$.

$\nabla g = \left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b} \right) \neq 0$

$L(x,y) = x^2 + y^2 - \lambda \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} - 1 \right)$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= 2x - \frac{\lambda}{a} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= 2y - \frac{\lambda}{b} = 0 \\ g(x,y) &= \frac{x}{a} + \frac{y}{b} - 1 = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x &= \frac{\lambda}{2a} \\ y &= \frac{\lambda}{2b} \\ \frac{\lambda}{2a^2} + \frac{\lambda}{2b^2} &= 1 \Rightarrow \lambda = \frac{2a^2b^2}{a^2+b^2} \Rightarrow A = \left(\frac{ab^2}{a^2+b^2}, \frac{a^2b}{a^2+b^2} \right) \end{aligned}$$

$$f(A) = \frac{a^2b^2}{(a^2+b^2)^2} \cdot (b^2+a^2) = \frac{a^2b^2}{a^2+b^2} \quad f(0,b) = b^2 > f(A) \Rightarrow \forall A \text{ je lokální minimum}$$

$$4) f(x,y,z) = x^m y^m z^p \quad g(x,y,z) = x+y+z-a \quad m, m, p, a > 0.$$

$$\nabla g = (1, 1, 1) \neq 0$$

$$L(x,y,z) = x^m y^m z^p - \lambda(x+y+z-a)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= mx^{m-1}y^mz^p - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= mx^my^{m-1}z^p - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} &= px^my^mz^{p-1} - \lambda = 0 \\ g(x,y,z) &= x+y+z-a = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \text{Nechť } x,y,z \neq 0: \quad mx^m y^m z^p &= \lambda x \Rightarrow x = \frac{m}{\lambda} x^m y^m z^p \\ mx^m y^m z^p &= \lambda y \Rightarrow y = \frac{m}{\lambda} x^m y^m z^p \\ px^m y^m z^p &= \lambda z \Rightarrow z = \frac{p}{\lambda} x^m y^m z^p \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{m+m+p}{\lambda} \cdot x^m y^m z^p = a$$

$$\lambda = \frac{m+m+p}{a} x^m y^m z^p$$

$$\Rightarrow mx^{m-1}y^mz^p = \frac{m+m+p}{a} x^m y^m z^p \Rightarrow x = \frac{am}{m+m+p} \quad \text{Analogicky } y = \frac{am}{m+m+p}, z = \frac{ap}{m+m+p}$$

Body $x=0, (y=0, z=0)$ jsou na hranici definičního oboru $f \Rightarrow$ nemá smysl tam hledat lokální extrém. Jediný podezřelý bod je $A = \left(\frac{am}{m+m+p}, \frac{am}{m+m+p}, \frac{ap}{m+m+p} \right)$ a protože $f(A) > 0$, zatímco poblíž hranice je f blízko nuly, je nutné v bodě A lokální maximum.

$$5) f(x,y,z) = \sin x \sin y \sin z \quad g(x,y,z) = x+y+z - \frac{\pi}{2}, \quad x,y,z > 0, \text{ tj. } x,y,z \in (0, \frac{\pi}{2})$$

$$\nabla g = (1, 1, 1) \neq 0$$

$$L(x,y,z) = \sin x \sin y \sin z - \lambda(x+y+z - \frac{\pi}{2})$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= \cos x \sin y \sin z - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= \sin x \cos y \sin z - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} &= \sin x \sin y \cos z - \lambda = 0 \\ g &= x+y+z - \frac{\pi}{2} = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \cos x \sin y \sin z &= \sin x \cos y \sin z. \text{ Protože } \sin z \neq 0, \\ \text{máme } \sin(x-y) &= 0 \Rightarrow x=y. \text{ Podobně získáme } x=y=z. \\ \text{A z vazebních podmínek } &x=y=z = \frac{\pi}{6}. \quad A = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right) \\ f(A) &= \frac{1}{8}. \text{ Pro } x \rightarrow 0 \text{ je } f(x,y,z) \rightarrow 0 \text{ a} \end{aligned}$$

úvahu tak dostáváme, že v bodě A je lokální maximum.

6) $f(x) = \sum_{i=1}^m x_i^p$ $g(x) = \sum_{i=1}^m x_i - a$ $p > 1, a \geq 0$
 $x = (x_1, \dots, x_m)$

$\nabla g = (1, 1, \dots, 1) \neq 0$
 $L(x) = \sum_{i=1}^m x_i^p - \lambda \left(\sum_{i=1}^m x_i - a \right)$
 $\frac{\partial L}{\partial x_j} = p x_j^{p-1} - \lambda = 0$ $\forall j=1, \dots, m: x_j = \left(\frac{\lambda}{p} \right)^{\frac{1}{p-1}} \Rightarrow m \cdot \left(\frac{\lambda}{p} \right)^{\frac{1}{p-1}} = a$
 $g = \sum_{i=1}^m x_i - a = 0 \Rightarrow \lambda = p \cdot \left(\frac{a}{m} \right)^{p-1} \Rightarrow x_j = \frac{a}{m}$

$A = \left(\frac{a}{m}, \dots, \frac{a}{m} \right)$ $f(A) = \frac{a^p}{m^{p-1}}$ Proložte v bodě $(a, 0, \dots, 0)$ je $f(x) = a^p > f(A)$
 Soudíme, že v bodě A je lokální minimum


7) $f(x, y) = x - 2y - 3$ $M = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1\}$

M je kompaktní množina (omezená a uzavřená), f je spojitá $\Rightarrow$ nabývá maxima a minima

1. krok: extrémů uvnitř M: $\nabla f = (1, -2) \neq 0 \Rightarrow$ uvnitř M nejsou stacionární body.

$\Rightarrow$ extrémů se nabývají na hranici

2. krok: vázané extrémů na ∂M :



a) $y=0, x \in [0, 1]: \tilde{f}(x) = f(x, 0) = x - 3$
 nejmenší hodnota zde je $\tilde{f}(0) = -3$
 největší hodnota zde je $\tilde{f}(1) = -2$

b) $x=0, y \in [0, 1]: \bar{f}(y) = f(0, y) = -2y - 3$
 nejmenší hodnota zde je $\bar{f}(1) = -5$
 největší hodnota zde je $\bar{f}(0) = -3$

c) $g(x, y) = x + y - 1$

$\nabla g = (1, 1) \neq 0$

$L(x, y) = x - 2y - 3 - \lambda(x + y - 1) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -2 - \lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \\ \lambda = -2 \end{cases}$ spor. Nejsou žádné stac. body

$\Rightarrow$ extrémů se nabývají v roztoku. Nejvyšší hodnota je -2 v bodě $(1, 0)$
 Nejmenší hodnota je -5 v bodě $(0, 1)$

8) $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ $M = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$

1. extrémů uvnitř: $\nabla f = (2x - y, -x + 2y)$


$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \text{ a } y = 0$

$H_f = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ je poz. def. $\Rightarrow$ v počátku je lokální minimum, $f(0, 0) = 0$

2. vázané extrémů na ∂M : a) $x + y = 1; x \geq 0, y \geq 0: g(x, y) = x + y - 1, \nabla g = (1, 1) \neq 0$

$L(x, y) = x^2 - xy + y^2 - \lambda(x + y - 1) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - y - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -x + 2y - \lambda = 0 \\ g = x + y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x - \lambda \\ x = \lambda \\ \lambda = 1/2 \end{cases} \Rightarrow A = (1/2, 1/2)$

$f(A) = 1/4, f(0, 1) = 1 \Rightarrow$ V bodě A je loč. min. vzhledem k vazbě. Ale $f(A) \geq f(0, 0)$, takže nás nezajímá.



M je kompaktní
 f je spojitá

$\Rightarrow$ existují glob. extrémů na M

b) $-x+y=1, x \leq 0, y \geq 0 : g(x,y) = -x+y-1, \nabla g = (-1,1) \neq 0$

$$L(x,y) = x^2 - xy + y^2 - \lambda(-x+y-1) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -x + 2y - \lambda = 0 \\ g = -x + y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x + \lambda \\ \lambda = -3x \\ \Rightarrow x = -1/2, y = 1/2 \end{cases} \Rightarrow B = (-1/2, 1/2)$$

$f(B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, f(0,1) = 1 \Rightarrow B$ je lok. minimum vzhledem k vazbě, ale $f(B) > f(0,0)$.

c) $-x-y=1, x \leq 0, y \leq 0$ analogicky jako a) $C = (-1/2, -1/2), f(C) = 1/4$ je opet lok. min.

d) $x-y=1, x \geq 0, y \leq 0$ analogicky jako b) $D = (1/2, -1/2), f(D) = 3/4$ je opet lok. min.

Nejvyšší hodnoty se tedy nabývají v rozích čtverce, $f(0, \pm 1) = f(\pm 1, 0) = 1$.

Globální minimum je v počátku, kde $f(0,0) = 0$.

9) $f(x,y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y, M = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 25\}$ (Spojitá f na kompaktnu)

1. lokální extrémů vně: $\nabla f = (2x-12, 2y+16) \Rightarrow x=6, y=-8$. Bod $(6,-8) \notin M$!

Vnitr M tak nejsou lokální extrémů

2. vázané extrémů na hranici: $g(x,y) = x^2 + y^2 - 25, \nabla g = (2x, 2y) \neq 0$ na $\{g=0\}$

$$L(x,y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y - \lambda(x^2 + y^2 - 25) : \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 12 - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 16 - 2\lambda y = 0 \\ g = x^2 + y^2 - 25 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \text{ ovidně } \lambda \neq 1 \text{ a pak} \\ x = \frac{6}{1-\lambda}, y = \frac{-8}{1-\lambda} \\ \Rightarrow \frac{100}{(1-\lambda)^2} = 25 \end{cases}$$

Dostáváme podezřelé body $A = (-3, 4)$
a $B = (3, -4)$.

$$\begin{aligned} (1-\lambda)^2 &= 4 \\ (1-\lambda)^2 &= 4 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \lambda &= 3 \\ \lambda &= -1 \end{aligned}$$

$f(A) = 125$ a $f(B) = -75 \Rightarrow$ v bodě B je nejmenší hodnota f na M
v bodě A je největší hodnota f na M.

10) $f(x,y,z) = x+y+z, M = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ (spojitá na kompaktnu)

1. lokální extrémů vně: $\nabla f = (1,1,1) \neq 0 \Rightarrow$ nejsou

2. vázané extrémů na hranici. Hranici rozdělíme na dvě části: $M_1 = \{(x,y,z) : z=1, x^2 + y^2 \leq 1\}$
 $M_2 = \{(x,y,z) : z \in [0,1), x^2 + y^2 = z\}$

$M_1: \tilde{f}(x,y) = f(x,y,1) = x+y+1$. Dále $\nabla \tilde{f} = (1,1) \Rightarrow$ není extrém v množině $\{(x,y) : x^2 + y^2 < 1\}$
 $\Rightarrow$ vyšetříme $\tilde{f}(x,y)$ na kružnici $x^2 + y^2 = 1$, tj. $\tilde{g}(x,y) = x^2 + y^2 - 1, \nabla \tilde{g} = (2x, 2y) \neq 0$ na $\{\tilde{g}=0\}$.

$$\tilde{L}(x,y) = x+y+1 - \lambda(x^2 + y^2 - 1) : \begin{cases} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial x} = 1 - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \tilde{L}}{\partial y} = 1 - 2\lambda y = 0 \\ \tilde{g} = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=y=\frac{1}{2\lambda} \Rightarrow \frac{1}{2\lambda^2} = 1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \\ A = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) \quad B = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) \end{cases}$$

$\tilde{f}(A) = f(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1) = 1 + \sqrt{2}, \tilde{f}(B) = 1 - \sqrt{2}$

$$H_2: g(x,y,z) = x^2 + y^2 - z \quad \nabla g = (2x, 2y, -1) \neq 0$$

$$L(x,y,z) = x+y+z - \lambda(x^2+y^2-z) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1-2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 1-2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 1+\lambda = 0 \\ g = x^2+y^2-z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -1 \Rightarrow x = -1/2, y = -1/2 \\ \Rightarrow z = 1/2 \\ \Rightarrow C = (-1/2, -1/2, 1/2), C \in H_2 \\ f(C) = -1/2 \end{cases}$$

V bodě A nabývá f své nejvyšší hodnoty na M .

$f(C) < f(B) \Rightarrow$ V bodě C nabývá f své nejnižší hodnoty na M .

11) Chceme minimalizovat fci $f(x,y,z) = 2(xy+yz+xz)$ s vztahem $g(x,y,z) = xyz - V = 0$,

kde V je daný objem. Samozřejmě pracujeme na $\{(x,y,z): x>0, y>0, z>0\}$.

$\nabla g = (yz, xz, xy) \neq 0$ na studované množině

$$L(x,y,z) = 2(xy+yz+xz) - \lambda(xyz - V) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2y+2z-\lambda yz = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2x+2z-\lambda xz = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 2y+2x-\lambda xy = 0 \\ g = xyz - V = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z \text{ l. ro: } y = \frac{2z}{\lambda z - 2} \\ z \text{ 2. ro: } x = \frac{2z}{\lambda z - 2} \\ \Rightarrow 4x - \lambda x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{\lambda} = y \\ \frac{4}{\lambda} = \frac{2z}{\lambda z - 2} \Rightarrow z = \frac{4}{\lambda} = x = y \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^3 - V = 0, x = \sqrt[3]{V}$$

Podezřelý bod je $(\sqrt[3]{V}, \sqrt[3]{V}, \sqrt[3]{V}) = A$, $f(A) = 6V^{2/3}$. Probetě $f(1,1,V) = 2+4V$ a pro všechna

$V>0$ platí $6V^{2/3} \leq 2+4V$, je v bodě A lokální minimum

$$L \text{ o.z.m. } z = V^{1/3}: 4z^3 - 6z^2 + 2 = (z-1)(4z^2 - 2z + 2) = \underbrace{2(z-1)^2}_{\geq 0} \underbrace{(2z+1)}_{\geq 0 \text{ pro kladná } z}$$

Ze všech kvádrů daného objemu má nejmenší povrch krychle.

12) Kužel má parametry r (poloměr podstavy) a v (výška). To jsou dané konstanty



Výšku vepsaného hranolu označíme y a poloměr kružnice opsané základně hranolu ozn. x .

Vazební podmínka pak je $\frac{r}{v} = \tan \varphi = \frac{x}{v-y}$, kde φ je parametr daný r, v . $\varphi \in (0, \pi/2)$

Obsah n -úhelníku s kružnicí opsanou s poloměrem x je $S_n = \frac{1}{2} n \sin \frac{2\pi}{n} x^2 =: N x^2$

$\Rightarrow$ Objem hranolu je $f(x,y) = N x^2 y$, kde N je číslo závislé pouze na n

$g(x,y) = \frac{x}{v-y} - \frac{r}{v}$ a zajímá nás samozřejmě $\{(x,y): x \in (0,r), y \in (0,v)\}$

$$\nabla g = \left(\frac{1}{v-y}, \frac{x}{(v-y)^2} \right) \neq 0 \text{ na naší množině. } L(x,y) = N x^2 y - \lambda \left(\frac{x}{v-y} - \frac{r}{v} \right)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2Nxy - \frac{\lambda}{v-y} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = Nx^2 - \frac{\lambda x}{(v-y)^2} = 0 \\ g = \frac{x}{v-y} - \frac{r}{v} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 2Nxy(v-y) \\ Nx^2(v-y)^2 = 2Nx^2y(v-y) \\ \Rightarrow (v-y) = 2y \Rightarrow y = \frac{v}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3}r \end{cases}$$

Bod $A = (\frac{2}{3}r, \frac{1}{3}v)$ je zjevně bodem maxima, protože $f(x,y) \rightarrow 0$ pro $x \rightarrow 0$
Ze všech hranolů má nejvyšší objem ten s třetinou výšky kužele.

13) Rovnice roviny slouží jako vazba, tedy $g(x,y,z) = ax + by + cz + d$
 Vzdálenost bodu (x,y,z) a (p,q,r) je $f(x,y,z) = \sqrt{(x-p)^2 + (y-q)^2 + (z-r)^2}$
 $\nabla g = (a,b,c)$ a skutečně alespoň jedno z těchto čísel musí být nenulové, aby rovina měla smysl.
 $L(x,y,z) = \sqrt{(x-p)^2 + (y-q)^2 + (z-r)^2} - \lambda(ax + by + cz + d)$. Necht' $ap + bq + cr + d \neq 0$, jinak je vzdálenost
 očividně nula.

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= \frac{x-p}{\sqrt{\dots}} - \lambda a = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= \frac{y-q}{\sqrt{\dots}} - \lambda b = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} &= \frac{z-r}{\sqrt{\dots}} - \lambda c = 0 \\ g &= ax + by + cz + d = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{z prvních tří rovnic: } \lambda^2 a^2 + \lambda^2 b^2 + \lambda^2 c^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \\ &\text{Pro } a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0 \text{ dostaneme} \\ &\quad \frac{x-p}{a} = \frac{y-q}{b} = \frac{z-r}{c} \quad (\text{je-li např. } a=0, \text{ tak } x=p) \\ &\quad x = \frac{a}{c}(z-r) + p, \quad y = \frac{b}{c}(z-r) + q \\ &\Rightarrow \frac{a^2}{c^2}(z-r) + ap + \frac{b^2}{c^2}(z-r) + bq + cz + d = 0 \\ &\Rightarrow z = \frac{(a^2 + b^2)r}{a^2 + b^2 + c^2} - \frac{c \cdot (ap + bq + d)}{a^2 + b^2 + c^2} \\ &\Rightarrow z - r = -\frac{c \cdot (ap + bq + cr + d)}{a^2 + b^2 + c^2} \quad \text{a odtud můž. } y - q = -b \cdot \frac{ap + bq + cr + d}{a^2 + b^2 + c^2}, \quad x - p = -a \cdot \frac{ap + bq + cr + d}{a^2 + b^2 + c^2} \\ &\Rightarrow f(A) = \frac{|ap + bq + cr + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad \text{Očividně jde o minimum, } f \text{ je shora neomezená.} \end{aligned}$$

14) Toto je mimořádně odporná úloha. Bez použití vázaných extrémů lze řešit jen lokálním extrémem funkce

$$f(t,s) = \sqrt{(x_1 + at - x_2 - ps)^2 + (y_1 + bt - y_2 - qs)^2 + (z_1 + ct - z_2 - rs)^2} \quad t, s \in \mathbb{R}$$

$$\text{Výsledek je } f(t_0, s_0) = \left| \det \begin{pmatrix} x_1 - x_2 & y_1 - y_2 & z_1 - z_2 \\ a & b & c \\ p & q & r \end{pmatrix} \right| \cdot \left((aq - bp)^2 + (ar - cp)^2 + (br - cq)^2 \right)^{-1/2}$$

15, a) Budeme zkoumat $f(x_1, \dots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$ s vazbou $g(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n - C_n$
 pro nějaké dané $C \geq 0$. Chceme ukázat, že $f(x_1, \dots, x_n) \leq C$ a uvažujeme $x_i \geq 0 \forall i$

$$\nabla g = (1, 1, \dots, 1) \neq 0$$

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} - \lambda(x_1 + x_2 + \dots + x_n - C_n)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{1}{n} \frac{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}}{x_i} - \lambda = 0 \Rightarrow x_i = \frac{1}{n} \frac{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}}{\lambda} \text{ platí } \forall i = 1, \dots, n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{všechna } x_i \text{ jsou si rovna}$$

$$g = x_1 + x_2 + \dots + x_n - C_n = 0 \Rightarrow x_i = C \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$f(C, C, \dots, C) = \sqrt[n]{C^n} = C$. Očividně jde o maximum, protože pro $x_1 = 0$ je $f = 0$.

b) Důkaz indukci podle n .

$n=1$: triviálně splněno jako rovnost.

Nechť nerovnost platí pro všechna $n < m$ a dokažeme ji pro $n=m$.

Budeme hledat extrémny funkce $f(x_1, \dots, x_m) = \left(\sum_{i=1}^m x_i^p\right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{i=1}^m y_i^q\right)^{1/q}$

s vazební podmínkou $g(x_1, \dots, x_m) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_m y_m - C$, kde tedy $x_i \geq 0$ $\forall i=1, \dots, m$
 $y_i \geq 0$

Je-li některé $x_j = 0$ (BÚNO necht' $j=m$), pak

$$\sum_{i=1}^m x_i y_i = \sum_{i=1}^{m-1} x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^{m-1} x_i^p\right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{i=1}^{m-1} y_i^q\right)^{1/q} = \left(\sum_{i=1}^m x_i^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^{m-1} y_i^q\right)^{1/q} \leq \left(\sum_{i=1}^m x_i^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^m y_i^q\right)^{1/q}$$

↑
I.P.

a dokažovaná nerovnost platí. Dále necht' jsou všechna $x_i \neq 0$.

$\nabla g = (y_1, y_2, \dots, y_m) \neq 0$ protože pokud je $y_1 = y_2 = \dots = y_m = 0$, tak nerovnost platí jako rovnost

$$L(x_1, \dots, x_m) = \left(\sum_{i=1}^m x_i^p\right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{i=1}^m y_i^q\right)^{1/q} - \lambda \left(\sum_{i=1}^m x_i y_i - C\right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_j} = \frac{1}{p} \left(\sum_{i=1}^m x_i^p\right)^{\frac{1}{p}-1} \cdot p \cdot x_j^{p-1} \cdot \left(\sum_{i=1}^m y_i^q\right)^{1/q} - \lambda y_j = 0 \Rightarrow \frac{x_j^{p-1}}{y_j} = \frac{\lambda}{\left(\sum_{i=1}^m y_i^q\right)^{1/q} \cdot \left(\sum_{i=1}^m x_i^p\right)^{\frac{1-p}{p}}} = \frac{\lambda \left(\sum_{i=1}^m x_i^p\right)^{\frac{p-1}{p}}}{\left(\sum_{i=1}^m y_i^q\right)^{1/q}}$$

Pravá strana nezávisí na j a je stejná pro všechny $j=1, \dots, m$

Do vazby dosadíme $x_j = x_1 \cdot \left(\frac{y_j}{y_1}\right)^{\frac{1}{p-1}}$ a máme $x_1 y_1 + \sum_{j=2}^m x_1 \cdot \frac{y_j^{\frac{p}{p-1}}}{y_1^{\frac{1}{p-1}}} = C$

$$\text{Podobně } x_j = \frac{C}{\sum_{i=1}^m y_i^q} \cdot y_j^{\frac{1}{p-1}} \quad \forall j=1, \dots, m$$

$$x_1 = \frac{C \cdot y_1^{\frac{1}{p-1}}}{\sum_{i=1}^m y_i^{\frac{p}{p-1}}} = \frac{C \cdot y_1^{\frac{1}{p-1}}}{\sum_{i=1}^m y_i^q}, \quad \text{protože } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Označme příslušný stacionární bod A a máme

$$f(A) = \frac{C}{\sum_{i=1}^m y_i^q} \cdot \left(\sum_{i=1}^m y_i^{\frac{p}{p-1}}\right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{i=1}^m y_i^q\right)^{1/q} = \left(\sum_{i=1}^m y_i^q\right)^{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1} \cdot C = C$$

Protože pro volbu $x_m = 0$ jsme už ukázali (díky indukčnímu předpokladu) $f(x_1, \dots, x_m) \geq C$,

je A bodem lokálního minima a proto platí $f(x_1, \dots, x_m) \geq C$ všude.

1b) Náboj umístěný v bodě $\vec{R}$ budí v bodě $\vec{r}$ potenciál $V = C \frac{Q}{|\vec{R} - \vec{r}|}$.

Potenciální energie se pak rovná $Cq \cdot \sum_{Q \in A, B, C} \frac{Q_i}{|\vec{R} - \vec{r}|}$. My chceme, aby v bodě $(1, 1, 1)$ byl

lokální extrém potenciální energie a případně lokální minimum, aby rovnováha byla stabilní.

My však vidíme, že potenciál je nejmenší v nekonečna a extrém, který případně najdeme, bude maximum, rovnováha tak nebude stabilní.

Budeme tedy hledat extrémny funkce

$$f(x, y, z) = Q \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + Q_A \cdot ((x-3)^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + Q_B \cdot (x^2 + (y-3)^2 + z^2)^{-1/2} + Q_C \cdot (x^2 + y^2 + (z-4)^2)^{-1/2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -Q(x^2+y^2+z^2)^{-3/2} \cdot x - Q_A((x-3)^2+y^2+z^2)^{-3/2} \cdot (x-3) - Q_B(x^2+(y-3)^2+z^2)^{-3/2} \cdot x - Q_C(x^2+y^2+(z-4)^2)^{-3/2} \cdot x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,1,1) = -Q \cdot 3^{-3/2} - Q_A \cdot 6^{-3/2} \cdot (-2) - Q_B \cdot 6^{-3/2} - Q_C \cdot 11^{-3/2} = 0$$

analogicky: $\frac{\partial f}{\partial y}(1,1,1) = -Q \cdot 3^{-3/2} - Q_A \cdot 6^{-3/2} - Q_B \cdot 6^{-3/2} \cdot (-2) - Q_C \cdot 11^{-3/2} = 0$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(1,1,1) = -Q \cdot 3^{-3/2} - Q_A \cdot 6^{-3/2} - Q_B \cdot 6^{-3/2} - Q_C \cdot 11^{-3/2} \cdot (-3) = 0$$

$$\Rightarrow Q \cdot 3^{-3/2} \cdot 3 + Q_C \cdot 11^{-3/2} \cdot (-1) = 0 \Rightarrow Q_C = Q \cdot 11^{3/2} \cdot 3^{-1/2}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} Q \cdot 3^{-3/2} + Q \cdot 3^{-1/2} + Q_A \cdot 6^{-3/2} - 2Q_B \cdot 6^{-3/2} &= 0 \\ Q \cdot 3^{-3/2} + Q \cdot 3^{-1/2} - 2Q_A \cdot 6^{-3/2} + Q_B \cdot 6^{-3/2} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} 3Q_A \cdot 6^{-3/2} &= 3Q_B \cdot 6^{-3/2} \\ \Rightarrow Q_A &= Q_B \end{aligned}$$

$$Q_A \cdot 6^{-3/2} = Q \cdot 4 \cdot 3^{-3/2} \Rightarrow Q_A = Q_B = Q \cdot 8\sqrt{2}$$

REGULÁRNÍ ZOBRAZENÍ

Jacobiho matice zobrazení $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ v bodě $a \in \mathbb{R}^N$

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_N}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_N}{\partial x_N}(a) \end{pmatrix}$$

Jacobian je determinant $J_f(a)$, označme $J_f(a)$

f je regulární zobrazení na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, je-li Ω otevřená, $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$ a $J_f \neq 0$ na Ω

Například $f: (r, \varphi) \mapsto (x, y)$ tak, že $x = r \cos \varphi$ je regulární na $(0, \infty) \times (0, 2\pi)$

$$y = r \sin \varphi$$

$$J_f = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix} \Rightarrow J_f = r > 0$$

Věta o regulárním zobrazení

Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ je regulární na Ω (otevřená množina). Pak $f(\Omega)$ je otevřená a f je lokálně prosté (f je prosté na nějakém okolí každého bodu).

Je-li navíc f prosté na Ω , pak f^{-1} je regulární zobrazení na $f(\Omega)$ a $\forall x \in \Omega$ platí

$$J_{f^{-1}}(f(x)) = (J_f(f(x)))^{-1}. \text{ Je-li } f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^N), \text{ pak } f^{-1} \in C^k(f(\Omega); \mathbb{R}^N).$$

Z inverze matice plyne $J_{f^{-1}}(f(x)) = \frac{1}{J_f(f(x))}$

17) $(z_y)^2 z_{xx} - 2z_x z_y z_{xy} + (z_x)^2 z_{yy} = 0$

$$\begin{aligned} x &= u \\ y &= v \\ z &= w \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \text{u nás zajímá nová funkce} \\ & w(v, u) \end{aligned}$$

Princip si ukažeme jak v obecnosti, tak v navržené speciální transformaci

Máme
$$\begin{aligned} u &= a(x, y, z(x, y)) = x \\ v &= b(x, y, z(x, y)) = y \\ w &= c(x, y, z(x, y)) = z \end{aligned}$$

(9)

Abychom mohli vyjádřit w jako funkci v a y , potřebujeme obecnější větu o implicitních funkcích, která funguje pro

$$D_{bc} = \begin{vmatrix} b_y + b_z z_y & b_z \\ c_y + c_z z_y & c_z \end{vmatrix} \neq 0, \text{ což je příslušný subdeterminant}$$

Jacobiho matice $(x, y, z) \mapsto (u, v, w)$, tedy

$$\begin{pmatrix} a_x + a_z z_x & a_y + a_z z_y & a_z \\ b_x + b_z z_x & b_y + b_z z_y & b_z \\ c_x + c_z z_x & c_y + c_z z_y & c_z \end{pmatrix}$$

V našem případě $b_y = c_z = 1$ a ostatní derivace jsou nula, proto $D_{bc} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ z_y & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$

Existuje tak funkce $w = h(v, y) = a(p(v, y), q(v, y), z(p(v, y), q(v, y))) = a(x, y, z(x, y))$

Podíváme se na tento vztah v proměnných x, y : $h(v(x, y), y) = a(x, y, z(x, y))$

a derivujeme podle x a y : $h_v v_x + h_w w_x = a_x + a_z z_x$

$$h_v v_y + h_w w_y = a_y + a_z z_y$$

$$\begin{aligned} v &= b(x, y, z(x, y)) \Rightarrow h_v(b_x + b_z z_x) + h_w(c_x + c_z z_x) = a_x + a_z z_x \\ w &= c(x, y, z(x, y)) \end{aligned}$$

$$\text{Odtud vyjádříme } z_x \text{ a } z_y: \quad z_x = \frac{h_v b_x + h_w c_x - a_x}{a_z - h_v b_z - h_w c_z} \left(= \frac{-1}{-h_w} = \frac{1}{h_w} \right) \text{ v našem případě}$$

$$z_y = \frac{h_v b_y + h_w c_y - a_y}{a_z - h_v b_z - h_w c_z} \left(= \frac{h_v}{-h_w} = -\frac{h_v}{h_w} \right) \text{ v našem případě}$$

Druhé derivace získáme derivací z_x a z_y :

$$z_{xx} = \left(\frac{1}{h_w} \right)_x = -\frac{1}{h_w^2} \cdot (h_w)_x = -\frac{1}{h_w^2} \cdot (h_{wv} v_x + h_{ww} w_x) = -\frac{1}{h_w^2} \cdot (h_{wv} (b_x + b_z z_x) + h_{ww} (c_x + c_z z_x)) = -\frac{1}{h_w^2} \cdot h_{ww} z_x = \underline{\underline{-\frac{h_{ww}}{h_w^3}}}$$

$$z_{xy} = -\frac{1}{h_w^2} (h_{wv} v_y + h_{ww} w_y) = -\frac{1}{h_w^2} (h_{wv} + h_{ww} z_y) = \underline{\underline{\frac{h_{ww} h_v}{h_w^3} - \frac{h_{ww}}{h_w^2}}}$$

$$z_{yy} = -\frac{1}{h_w^2} \cdot ((h_{wv} v_y + h_{ww} w_y) h_w - (h_{wv} v_y + h_{ww} w_y) h_v) = \underline{\underline{-\frac{h_{ww}}{h_w} + 2 \frac{h_{ww} h_v}{h_w^2} - \frac{h_{ww} h_v^2}{h_w^3}}}$$

Konečně můžeme rovnici přepsat

$$\frac{h_v^2}{h_w^2} \cdot \left(-\frac{h_{ww}}{h_w^3} \right) - 2 \cdot \frac{1}{h_w} \cdot \left(-\frac{h_v}{h_w} \right) \cdot \left(\frac{h_{ww} h_v}{h_w^3} - \frac{h_{ww}}{h_w^2} \right) + \frac{1}{h_w^2} \cdot \left(-\frac{h_{ww}}{h_w} + 2 \frac{h_{ww} h_v}{h_w^2} - \frac{h_{ww} h_v^2}{h_w^3} \right) = 0$$

$$\text{Zůstává pouze } \frac{h_{ww}}{h_w^3} = 0, \text{ tedy } h_{vv} = 0 \Rightarrow h_v = C_1(w) \\ \Rightarrow h = v \cdot C_1(w) + C_2(w)$$

Což můžeme přepsat v původních souřadnicích jako

$$\underline{\underline{x = y \cdot C_1(z) + C_2(z)}}$$

18) Označme $\tilde{f}(r, \varphi, \theta) = f(x(r, \varphi, \theta), y(r, \varphi, \theta), z(r, \varphi, \theta))$.

tedy $x(r, \varphi, \theta) = r \sin \theta \cos \varphi$
 $y(r, \varphi, \theta) = r \sin \theta \sin \varphi$
 $z(r, \varphi, \theta) = r \cos \theta$

Máme $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} = f_x x_r + f_y y_r + f_z z_r = f_x \sin \theta \cos \varphi + f_y \sin \theta \sin \varphi + f_z \cos \theta$

$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} = f_x x_\theta + f_y y_\theta + f_z z_\theta = f_x r \cos \theta \cos \varphi + f_y r \cos \theta \sin \varphi - f_z r \sin \theta$

$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} = f_x x_\varphi + f_y y_\varphi + f_z z_\varphi = -f_x r \sin \theta \sin \varphi + f_y r \sin \theta \cos \varphi$

$\Rightarrow r \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cos \theta = r f_x \sin^2 \theta \cos \varphi + r f_y \sin^2 \theta \sin \varphi + r f_x \cos^2 \theta \cos \varphi + r f_y \cos^2 \theta \sin \varphi$
 $= r f_x \cos \varphi + r f_y \sin \varphi$

$\Rightarrow \left(r \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cos \theta \right) \cdot \sin \theta \cos \varphi - \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} \sin \varphi = r f_x \sin \theta \cos^2 \varphi + r f_x \sin \theta \sin^2 \varphi = r f_x \sin \theta$

$\Rightarrow f_x = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \sin \theta \cos \varphi + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot \frac{1}{r} \cos \theta \cos \varphi - \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} \frac{\sin \varphi}{r \sin \theta}$

19) $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$

$u = x$
 $v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$
 $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$

Podobně jako v příkladu 17,

... potřebujeme $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$

$w = a(x, y, z(x, y)) = x$
 $v = b(x, y, z(x, y)) = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$
 $w = c(x, y, z(x, y)) = \frac{1}{z(x, y)} - \frac{1}{x}$

Chceme $w = h(u, v)$, tj. potřebujeme nemulovost

$D_{a,b} = \begin{vmatrix} a_x + a_z z_x & a_y + a_z z_y \\ b_x + b_z z_x & b_y + b_z z_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{x^2} & -\frac{1}{y^2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{y^2} \neq 0$

$w = h(u, v) = h(w(x, y), v(x, y)) = c(x, y, z(x, y)) = \frac{1}{z(x, y)} - \frac{1}{x}$

$\Rightarrow h_w w_x + h_v v_x = c_x + c_z z_x$, tedy $h_w + h_v \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{z^2} z_x \Rightarrow x^2 z_x = z^2 - z^2 h_v - x^2 z^2 h_w$

$h_w w_y + h_v v_y = c_y + c_z z_y$, tedy $-h_v \cdot \frac{1}{y^2} = -\frac{1}{z^2} z_y \Rightarrow y^2 z_y = h_v z^2$

$\Rightarrow x^2 z_x + y^2 z_y = z^2 - x^2 z^2 h_w \Rightarrow$ zadaná rovnost se nám přepíše na $x^2 z^2 h_w = 0$ a potřebujeme

vyjádřit ještě x a z pomocí u, v, w . Máme $x = w$ a $\frac{1}{z} = w + \frac{1}{x} = w + \frac{1}{w} = \frac{w^2 + 1}{w}$

$\Rightarrow z = \frac{w}{w^2 + 1}$

A dostáváme $\frac{w^4 \cdot \frac{\partial w}{\partial w}(u, v)}{(w \cdot w(u, v) + 1)^2} = 0$. Protože $w \neq 0$ (viz $x \neq 0$) a ze vztahu $\frac{1}{z} = \frac{w^2 + 1}{w}$ plyne $w^2 + 1 \neq 0$, můžeme získanou rovnost napsat jen jako

$\frac{\partial w}{\partial w}(u, v) = 0$.

$$20) z_{xx} + z_{yy} = 0$$

$$u = \frac{x}{x^2+y^2} \quad v = \frac{-y}{x^2+y^2}$$

(11)

$$u = a(x, y, z(x, y)) = \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$v = b(x, y, z(x, y)) = \frac{-y}{x^2+y^2}$$

$$w = c(x, y, z(x, y)) = z$$

$$\text{Chceme } w = h(u, v) \Rightarrow$$

$$D_{a,b} = \begin{vmatrix} \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} & \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{-x^2-y^2+2y^2}{(x^2+y^2)^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{(x^2+y^2)^4} \cdot ((y^2-x^2)^2 + 4x^2y^2) = \frac{1}{(x^2+y^2)^4} \neq 0$$

$$w = h(u, v) = h(u(x, y), v(x, y)) = z(x, y)$$

$$h_u u_x + h_v v_x = z_x \Rightarrow h_u \cdot \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} + h_v \cdot \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} = z_x$$

$$h_u u_y + h_v v_y = z_y \Rightarrow \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} h_u + \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} h_v = z_y$$

Výsledek zderivujeme ještě jednou, přičemž opět $h_u(u(x, y), v(x, y))$ derivujeme jako složenou fci

$$z_{xx} = (h_{uu} u_x + h_{uv} v_x) \cdot \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} + h_{uw} \cdot \frac{-2x \cdot (x^2+y^2)^2 - (y^2-x^2) \cdot 4x \cdot (x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^4} + (h_{uv} u_x + h_{vv} v_x) \cdot \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} + h_{vw} \cdot \frac{2y(x^2+y^2)^2 - 2xy \cdot 4x(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^4}$$

$$z_{yy} = (h_{uu} u_y + h_{uv} v_y) \cdot \left(\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} \right) + h_{uw} \cdot \frac{-2x \cdot (x^2+y^2)^2 + 2xy \cdot 4y \cdot (x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^4} + (h_{uv} u_y + h_{vv} v_y) \cdot \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} + h_{vw} \cdot \frac{2y(x^2+y^2)^2 - (y^2-x^2) \cdot 4y(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^4}$$

Sečteno a rovnou vynásobíme výrazem $(x^2+y^2)^4$

$$0 = h_{uu} \cdot [(y^2-x^2)^2 + 4x^2y^2] + h_{uv} \cdot [2xy(y^2-x^2) - 2xy(y^2-x^2) + 2xy(y^2-x^2) - 2xy(y^2-x^2)] + h_{uw} \cdot [4x^2y^2 + (y^2-x^2)^2] + h_{vv} \cdot [-4x(x^2+y^2)^2 - 4x(y^4-x^4) + 4x(2y^2x^2 + 2y^4)] + h_v \cdot [4y(x^2+y^2)^2 - 4y(y^4-x^4) - 4y(2x^4 + 2x^2y^2)]$$

$$= h_{uu} \cdot (x^2+y^2)^2 + h_{vv} \cdot (x^2+y^2)^2 \Rightarrow h_{uu} + h_{vv} = 0 \text{ neboli } w_{uu} + w_{vv} = 0$$

Jinými slovy Laplaceův operátor $\Delta z = z_{xx} + z_{yy}$ se danou změnou souřadnic ve 2D nezmění

→ ať má násobek/dělení výrazem $(x^2+y^2)^2$

$$21) x^2 z_{xx} - (x^2+y^2) z_{xy} + y^2 z_{yy} = 0$$

$$u = x+y \quad v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \quad \dots x \neq 0, y \neq 0$$

$$\text{Opět } D_{a,b} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{1}{x^2} & -\frac{1}{y^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} \dots \text{Nevic vyřadí body } x = \pm y$$

$$w = h(u, v) = h(u(x, y), v(x, y)) = z(x, y) \Rightarrow h_u - h_v \cdot \frac{1}{x^2} = z_x \quad \text{a} \quad h_u - \frac{1}{y^2} h_v = z_y$$

$$z_{xx} = (h_{uu} - h_{uv} \cdot \frac{1}{x^2}) + \frac{2}{x^3} h_v - \frac{1}{x^2} (h_{uv} - h_{vv} \cdot \frac{1}{x^2}) = h_{uu} - \frac{2}{x^2} h_{uv} + \frac{1}{x^4} h_{vv} + \frac{2}{x^3} h_v$$

$$z_{xy} = (h_{uu} - \frac{1}{y^2} h_{uv}) - \frac{1}{x^2} (h_{uv} - \frac{1}{y^2} h_{vv}) = h_{uu} - (\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}) h_{uv} + \frac{1}{x^2 y^2} h_{vv}$$

$$z_{yy} = (h_{uu} - \frac{1}{y^2} h_{uv}) + \frac{2}{y^3} h_v - \frac{1}{y^2} (h_{uv} - \frac{1}{y^2} h_{vv}) = h_{uu} - \frac{2}{y^2} h_{uv} + \frac{1}{y^4} h_{vv} + \frac{2}{y^3} h_v$$

$$\begin{aligned}
 x^2 z_{xx} - (x^2 + y^2) z_{xy} + y^2 z_{yy} &= x^2 h_{uv} - 2h_{uv} + \frac{1}{x^2} h_{uv} + \frac{2}{x} h_v \\
 &\quad - (x^2 + y^2) h_{uv} + \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 y^2} h_{uv} - \frac{1}{y^2} h_{uv} - \frac{1}{x^2} h_{uv} \\
 &\quad + y^2 h_{uv} - 2h_{uv} + \frac{1}{y^2} h_{uv} + \frac{2}{y} h_v \\
 &= \frac{(x^2 - y^2)^2}{x^2 y^2} h_{uv} + 2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) h_v \quad \text{Víme } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = v
 \end{aligned}$$

a zbývá vyjádřit $\frac{x^2}{y^2} - 2 + \frac{y^2}{x^2}$ pomocí u a v . Máme $u \cdot v = (x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 2$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow u^2 v^2 &= \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 4 + 4\frac{x}{y} + 4\frac{y}{x} + 2 \\
 &= \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 4uv - 2
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{y^2} - 2 + \frac{y^2}{x^2} = \frac{(x^2 - y^2)^2}{x^2 y^2} = uv(uv - 4)$$

Zadaná rovnice je také přepsaná jako

$$uv(uv - 4) z_{uv} + 2v z_v = 0 \quad \text{a protože } v \neq 0$$

$$u(uv - 4) z_{uv} + 2z_v = 0$$